• 临床研究 •

糖尿病足溃疡患者血清及创面组织 miR-29a-3p、VEGF 表达情况及对预后的影响

陆颖, 王春

【摘要】目的 探讨糖尿病足溃疡(DFU)患者血清及创面组织 miR-29a-3p、血管内皮生长因子(VEGF)表达情况及对预后的影响。**方法** 收集 2021 年 4 月至 2024 年 4 月蚌埠医学院第二附属医院收治的 DFU 患者 80 例。采用 Pearson 相关系数分析 miR-29a-3p 表达与 VEGF 表达的相关性; 荧光素酶活性检测探讨 miR-29a-3p 对 VEGF 的靶向调控作用; 采用 Logistic 回归分析影响预后的因素; 通过受试者工作特征(ROC)曲线评估 miR-29a-3p、VEGF 表达对预后的诊断价值。**结果** DFU 不同严重程度的患者糖尿病病程、糖化血红蛋白(HbA1c)、C 反应蛋白、VEGF 及 miR-29a-3p 差异均有统计学意义(均 $P < 0.05$); miR-29a-3p 可通过作用于 VEGF 3'-UTR 负向靶向调控 VEGF 表达, 且 DFU 患者血清、创面组织中 miR-29a-3p 表达与 VEGF 表达呈负相关(均 $P < 0.05$); VEGF 水平增加是患者预后的保护因素, 年龄、糖尿病病程、HbA1c、miR-29a-3p 增加是患者预后的危险因素, 且 VEGF、miR-29a-3p 对患者预后不良存在独立相关性(均 $P < 0.05$)。创面及血清中 miR-29a-3p、VEGF 对预后的诊断价值排序为创面 miR-29a-3p > 血清 miR-29a-3p > 创面 VEGF > 血清 VEGF。**结论** DFU 患者体内 miR-29a-3p 可负向靶向调控 VEGF 表达, VEGF 水平增加、miR-29a-3p 水平降低是患者预后的保护因素, miR-29a-3p 对预后的诊断价值优于 VEGF。

【关键词】 糖尿病足溃疡; 血管内皮生长因子; miR-29a-3p; 预后

doi:10.3969/j.issn.1671-0800.2024.11.012

【中图分类号】 R587.1 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1671-0800(2024)11-1446-04

糖尿病足溃疡(diabetic foot ulcer, DFU)的发生与糖尿病的多种病理、生理变化密切相关^[1], 也是糖尿病的严重并发症, 将导致患者截肢, 甚至危及生命^[2]。miR-29a-3p 是一种微小 RNA, 属于 miR-29 家族。研究显示, 在急性肺损伤、急性呼吸窘迫综合征中, miR-29a-3p 通过减少肺泡上皮细胞凋亡来改善肺损伤^[3]。miR-29a-3p 下调炎症因子如肿瘤坏死因子 α (TNF- α)、白介素 1 β (IL-1 β) 和白介素 6(IL-6) 的表达, 减少肺泡上皮细胞的凋亡, 从而改善肺损伤。血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)是一种高度特异性的促血管内皮细胞生长因子, 对血管内皮细胞具有强烈的促分裂和增殖作用^[4]。VEGF 通过与其特异性受体结合, 激活一系列信号转导通路, 促进内皮细胞增殖、迁移, 增加血管通透性, 促进血浆蛋白外渗, 形成血管生成的临时基质, 诱导血管形成。研究指出, VEGF 能促进 DFU 伤口

愈合^[5]。本研究拟探讨 DFU 患者血清及创面组织 miR-29a-3p、VEGF 表达情况及对预后的影响, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集 2021 年 4 月至 2024 年 4 月蚌埠医学院第二附属医院收治的 DFU 患者 80 例, 纳入标准: (1)符合 DFU 诊断标准^[6]; (2)年龄 ≥ 18 岁, 且临床资料完整。排除标准: (1)合并其他感染性疾病者, (2)住院期间放弃治疗者, (3)伴有认知功能障碍的精神疾病者。本研究获得蚌埠医学院第二附属医院伦理委员会批准, 豁免/免除知情同意。

80 例患者中男 46 例, 女 34 例; 年龄 36 ~ 87 岁, 平均(60.1 $\pm$ 7.3)岁; DFU 严重程度采用 Wagner 分级^[7], I 级 22 例, II 级 17 例, III 级 13 例, IV 级 28 例。将 Wagner I ~ II 级设为 A 组, Wagner III ~ IV 级设为 B 组。

DFU 愈合标准: (1)治疗 6 个月内伤口创面完全愈合, 未出现新发溃疡; (2)治疗 6 个月内原发溃疡愈合, 新发溃疡在其他区域或另足。所有患者均每个月随访 1 次, 随访 6 个月。若创面愈合则为预后

基金项目: 安徽省高校科研项目计划(自然科学类)(2022AH051456)

作者单位: 233000 安徽省蚌埠, 蚌埠医学院第二附属医院

通信作者: 陆颖, Email: 13625525635@163.com

良好,若创面未愈合、需截肢或死亡则为预后不良。

1.2 方法 (1)收集研究对象年龄、性别、体质量指数(BMI)、吸烟史、糖尿病病程、高血压史、冠心病史、饮酒史、收缩压(SBP)、平均动脉压(MAP)及舒张压(DBP)值。(2)生化指标收集。患者入院时采集空腹静脉血 5 ml,离心(3 000 r/min, 10 min)取血清,采用全自动生化分析仪检测总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、空腹血糖(FPG)、糖化血红蛋白(HbA1c)、低密度脂蛋白(LDL)及 C 反应蛋白(CRP)值。(3)创面组织 VEGF 测定。采用酶联免疫吸附实验(Enzyme linked immunosorbent assay, ELISA),将培养好的创面组织细胞,胰蛋白酶消化后,接种至 96 孔酶标板继续培养 48 h 后,收集贴壁细胞,4 400 r/min 离心 6 min,弃去上层培养基,加入蛋白裂解液进行裂解反应,用 BCA (BCA Protein Quantification Kit)试剂盒定量总蛋白,用 β -actin 做内参,计算 VEGF 蛋白表达水平。(4)血清 VEGF 测定。抽取患者空腹静脉血 5 ml,凝固后,3 000 r/min 离心 10 min,血清保存在-80℃冰箱。采用化学发光微粒子免疫法检测血清 VEGF 含量,试剂盒购自上海医学生物科技有限公司。(5)血清 miR-29a-3p 测定:入院后采集患者空腹静脉血 3 ml 注入干燥试管,待血液凝固后取上清液,3 000 r/min 离心 10 min。使用 TRIzol 试剂(上海碧云天生物技术股份有限公司)提取、测定 RNA 的浓度和纯度;使用逆转录试剂盒(上海碧云天生物技术股份有限公司)逆转录合成 cDNA;采用 Step One Plus™(美国赛默飞)实时荧光定量 PCR 系统进行 3 次重复的 PCR 分析,检测标本中 miR-29a-3p 的表达水平。引物序列:miR-29a-3p 上游为 5'-TACCTCGGTAGCACCATCATCAT-3',下游为 5'-TATCCTTGTTACGACTACTGTAC-3'; U6 (内参)上游为 5'-TGTCCACCTTCCAGCAGATGG-3',下游为 5'-GCTCAGTAACATTCCGCCTAGA-3'。采用 2^{-ΔΔCt}法计算血清、miR-29a-3p 相对表达量。(6)创面组织中 miR-29a-3p 测定。取部分创面组织标本,研磨组织,后续步骤同血清 miR-29a-3p 测定。

1.3 生物信息学预测和双荧光素酶实验 使用 Target Scan 数据库预测 miR-29a-3p 和 VEGF 的结合位点,并扩增上述片段。分别构建 VEGF 野生型(WT)质粒和突变型(MUT)质粒。将两种质粒分别与

miR-29a-3p mimics 及 miR-NC 混合。将培养好的创面组织细胞,胰蛋白酶消化后,继续培养 48 h,收集贴壁细胞,利用 Lipofectamine 2000 分别进行转染,转染 48 h 后,通过双荧光素酶检测系统检测相对荧光素酶活性水平。

1.4 统计方法 数据采用 SPSS 27.0 软件分析,符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,采用 *t* 检验;计量资料以率的形式表示,采用 χ^2 检验;采用 Logistic 回归分析影响预后的因素;采用 Pearson 相关系数分析相关性;通过受试者工作特征(ROC)曲线评估诊断价值。*P* < 0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 A 组与 B 组一般资料比较 A 组与 B 组糖尿病病程、HbA1c、FPG 及 CRP 差异均有统计学意义(均 *P* < 0.05),见表 1。

2.2 A 组与 B 组血清及创面组织中 miR-29a-3p 和 VEGF 表达情况比较 两组血清及创面中 VEGF 水平 A 组均显著高于 B 组(均 *P* < 0.05),创面中 miR-29a-3p A 组显著低于 B 组(*P* < 0.05),见表 2。

2.3 miR-29a-3p、VEGF 表达情况与临床特征的关系 以 miR-29a-3p 及 VEGF 表达水平中位数为界,将 DFU 患者分为 miR-29a-3p 高表达组(*n*=29)与低

表 1 A 组与 B 组一般资料比较

指标	A 组(<i>n</i> =39)	B 组(<i>n</i> =41)	$\chi^2(t)$ 值	<i>P</i> 值
性别(男/女,例)	20/19	26/15	1.20	> 0.05
年龄(岁)	58.7±5.4	60.2±5.6	(1.23)	> 0.05
BMI(kg/m ²)	24.38±2.62	23.32±2.27	(1.93)	> 0.05
糖尿病病程(年)	8.53±4.18	10.86±5.01	2.00	< 0.05
吸烟史(有/无,例)	20/19	19/22	0.19	> 0.05
饮酒史(有/无,例)	24/15	27/14	0.16	> 0.05
高血压史(有/无,例)	18/21	17/24	0.17	> 0.05
SBP(mmHg)	139.22±23.04	132.48±22.14	(0.33)	> 0.05
DBP(mmHg)	72.84±8.54	73.89±7.57	(0.58)	> 0.05
MAP(mmHg)	96.48±7.25	95.44±6.94	(0.65)	> 0.05
TC(mmol/L)	3.86±0.76	4.12±0.83	(1.45)	> 0.05
TG(mmol/L)	2.43±0.54	2.65±0.61	(1.70)	> 0.05
HDL(mmol/L)	1.16±0.26	1.21±0.31	(0.78)	> 0.05
LDL(mmol/L)	2.23±0.51	2.25±0.54	(0.17)	> 0.05
HbA1c(%)	8.72±0.92	9.86±0.94	(5.47)	< 0.05
FPG(mmol/L)	10.69±3.38	12.61±3.15	(2.63)	< 0.05
CRP(mg/L)	2.02±0.36	2.91±0.27	(12.55)	< 0.05

注: BMI 为体质量指数, SBP 为收缩压, MAP 为平均动脉压, DBP 为舒张压, TC 为总胆固醇, TG 为三酰甘油, HDL 为高密度脂蛋白, FPG 为空腹血糖, HbA1c 为糖化血红蛋白, LDL 为低密度脂蛋白, CRP 为 C 反应蛋白。1 mmHg≈0.133 kPa

表达组 ($n=51$), VEGF 高表达组 ($n=47$) 与低表达组 ($n=33$), 分析其糖尿病病程、HbAlc 及 CRP 水平, 结果显示仅血清中 VEGF 表达与 CRP 水平有关 ($\chi^2=22.78, P < 0.05$)。

2.4 miR-29a-3p 对 VEGF 的靶向调控作用 miR-29a-3p mimics 与含有 VEGF 3'-UTR 的野生型质粒共转染后, 荧光素酶活性受到明显抑制, 与 VEGF 3'-UTR 野生型质粒共转染的 miR-NC 与 miR-29a-3p mimics 的活力分别为 1.01 ± 0.04 与 0.54 ± 0.04 , 差异有统计学意义 ($t=14.39, P < 0.05$)。

2.5 miR-29a-3p 表达与 VEGF 表达相关性 DFU 患者血清、创面组织中 miR-29a-3p 表达均与 VEGF 表达呈负相关 ($r=-0.372, -0.449$, 均 $P < 0.05$)。

2.6 影响预后单因素分析 以预后不良为因变量, 以 VEGF、miR-29a-3p、年龄、糖尿病病程、HbAlc、CRP 为自变量, 结果显示, VEGF 水平增加是患者预后的保护因素 ($P < 0.05$); 年龄、糖尿病病程、HbAlc 及 miR-29a-3p 增加是患者预后的危险因素 (均 $P < 0.05$); CRP 水平与患者预后无关, 见表 3。

2.7 血清及创面组织 miR-29a-3p、VEGF 表达与患者预后不良的独立相关性 将与预后相关的变量纳入 Logistic 回归模型, 逐步排除混杂因素, 最终校正年龄、糖尿病病程、HbAlc。结果显示, miR-29a-3p、VEGF 水平与患者预后不良存在独立相关性 [$OR(95\%CI)=0.58(0.43 \sim 0.79), 0.70(0.53 \sim 0.86)$, 均 $P < 0.05$]。

miR-29a-3p、VEGF 二分类变量后, 血清及创面组织中较高水平 miR-29a-3p 与较低水平 miR-29a-3p 比较, 较高水平的 miR-29a-3p 与患者预后不良存在独立相关性 [$OR(95\%CI)=0.77(0.52 \sim 0.99), 0.72(0.54 \sim 0.95)$, 均 $P < 0.05$]; 血清及创面组织中较高水平 VEGF 与较低水平 VEGF 比较, 较低水平的 VEGF 与患者预后不良存在独立相关性 [$OR(95\%CI)=-0.69(-0.96 \sim -0.54), -0.75(-0.91 \sim -0.50)$, 均 $P < 0.05$]。

2.8 血清及创面组织中 miR-29a-3p、VEGF 表达对

预后的诊断价值 结果显示, 创面及血清中 miR-29a-3p 对预后诊断的 AUC 分别为 $0.862(0.858 \sim 0.941)$ 、 $0.837(0.803 \sim 0.886)$; 创面及血清中 VEGF 对预后的诊断 AUC 分别为 $0.773(0.528 \sim 0.904)$ 、 $0.725(0.515 \sim 0.863)$, 见表 4 及图 1。

3 讨论

一项关于糖尿病性视网膜病变的研究指出^[8], miR-29a-3p 的低表达可改善糖尿病性视网膜病变和血管功能障碍, 虽然该研究与本研究针对的糖尿病并发症不同, 但说明了 miR-29a-3p 在糖尿病相关病变中的作用。本研究分别将血清、创面组织中的 miR-29a-3p、VEGF 与临床特征比较后发现, 只有血清中 VEGF 表达与 CRP 水平相关。VEGF 是一种高度特异性的促血管内皮细胞生长因子, 具有促进血管通透性增加^[9]、血管内皮细胞迁移、增殖和血管形成等作用^[10-11]。CRP 是一种由肝脏合成的急性时相反应蛋白^[12-13], 在细菌感染或组织损伤等情况下, 其浓度会显著升高。但目前并没有直接的广泛认可的研究结果表明两者之间存在明确的、固定的关联。

本研究为验证在 DFU 患者体内 miR-29a-3p 靶向调控 VEGF, 通过 Target Scan 数据库分析发现两者间存在部分互补的关系, 通过开展荧光素酶活性

表 2 A 组与 B 组血清及创面组织中 miR-29a-3p 和 VEGF 表达情况比较

指标	部位	A 组($n=39$)	B 组($n=41$)	t 值	P 值
VEGF(pg/ml)	血清	63.45±10.18	56.32±9.57	3.22	< 0.05
	创面	65.72±8.69	60.05±11.23	2.51	< 0.05
miR-29a-3p	血清	1.65±0.71	1.94±0.62	1.94	> 0.05
	创面	1.62±0.45	2.07±0.66	3.54	< 0.05

表 3 影响 DFU 患者预后的因素分析

因素	OR 值(95%CI)	P 值
VEGF	0.871(0.806 ~ 0.994)	< 0.05
miR-29a-3p	1.642(1.373 ~ 1.806)	< 0.05
年龄	1.629(1.364 ~ 1.709)	< 0.05
糖尿病病程	2.004(1.559 ~ 2.807)	< 0.05
HbAlc	1.605(1.248 ~ 2.039)	< 0.05
CRP	1.146(0.891 ~ 1.327)	> 0.05

表 4 血清及创面组织中 miR-29a-3p、VEGF 表达对预后的诊断价值

指标	cut-off 值	灵敏度(%)	特异度(%)	AUC	95%CI	P 值 ^a
创面 miR-29a-3p	1.58	83.91	84.77	0.862	0.858 ~ 0.941	< 0.05
血清 miR-29a-3p	1.71	82.15	79.68	0.837	0.803 ~ 0.886	< 0.05
创面 VEGF	59.87	79.84	76.67	0.773	0.528 ~ 0.904	< 0.05
血清 VEGF	56.74	73.55	76.58	0.725	0.515 ~ 0.863	< 0.05

注: a 为与血清 VEGF 比较

图2 血清及创面组织中 miR-29a-3p、VEGF 表达对预后的诊断价值检测发现 miR-29a-3p 可通过作用于 VEGF 3'-UTR 抑制 VEGF 表达,相关性分析亦显示 DFU 患者血清、创面组织中 miR-29a-3p 表达与 VEGF 表达呈负相关。一项关于孕妇早期血清 miR-29a-3p 和 VEGFA 表达水平及其对子痫前期预测价值研究的报道指出^[14],子痫前期患者血清中 miR-29a-3p 表达上升,而 VEGFA 表达下降,这与本研究的结果相似。

本研究结果显示,VEGF 水平增加是 DFU 患者预后的保护因素;年龄、糖尿病病程、HbA1c、miR-29a-3p 增加是患者预后的危险因素;CRP 水平与患者预后无关。且血清及创面组织中较高水平 miR-29a-3p 与较低水平 miR-29a-3p 比较,较高水平的 miR-29a-3p 与患者预后不良存在独立相关性;血清及创面组织中较高水平 VEGF 与较低水平 VEGF 比较,较低水平的 VEGF 与患者预后不良存在独立相关性。根据 ROC 曲线绘制血清、创面组织中 miR-29a-3p、VEGF 表达对预后的诊断价值的 AUC 可判断创面及血清中 miR-29a-3p、VEGF 对预后的诊断价值排序创面中 miR-29a-3p > 血清 miR-29a-3p > 创面 VEGF > 血清 VEGF。

本研究可能存在的不足之处:(1)本研究仅纳入了 80 例 DFU 患者,需更大的样本量能够提供更可靠、更具普遍性的结论。(2)本研究主要关注了 miR-29a-3p 和 VEGF 的表达水平及其与预后的关系,但未涉及针对这些分子的治疗干预。

综上所述,DFU 患者体内 miR-29a-3p 可负向靶向调控 VEGF 表达,VEGF 水平增加、miR-29a-3p 水平降低是患者预后的保护因素,miR-29a-3p 对预后的诊断价值优于 VEGF。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 陆颖:实验操作、论文撰写、数据整理、统计学分析;王春:研究指导、论文修改、经费支持

参 考 文 献

- [1] HUANG F, LU X Y, YANG Y, et al. Microenvironment-based diabetic foot ulcer nanomedicine[J]. Adv Sci, 2023, 10(2): e2203308.
- [2] DAYYA D, O'NEILL O J, HUEDO-MEDINA T B, et al. Debridement of diabetic foot ulcers[J]. Adv Wound Care (New Rochelle), 2022, 11(12): 666-686.
- [3] CUI Y H, WANG X Q, LIN F Y, et al. MiR-29a-3p improves acute lung injury by reducing alveolar epithelial cell PANoptosis[J]. Aging Dis, 2022, 13(3): 899-909.
- [4] DU E M, LI X, HE S Y, et al. The critical role of the interplays of EphrinB2/EphB4 and VEGF in the induction of angiogenesis[J]. Mol Biol Rep, 2020, 47(6): 4681-4690.
- [5] LIU J Y, ZHANG Y H, LIU C, et al. A single dose of VEGF-A circular RNA sustains in situ long-term expression of protein to accelerate diabetic wound healing[J]. J Control Release, 2024, 373: 319-335.
- [6] LIPSKY B A, SENNEVILLE E, ABBAS Z G, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes (IWGDF 2019 update)[J]. Diabetes Metab Res Rev, 2020, 36(Suppl 1): e3280.
- [7] WAGNER F W. The dysvascular foot: A system for diagnosis and treatment[J]. Foot Ankle, 1981, 2(2): 64-122.
- [8] JIANG Q, LIU C, LI C P, et al. Circular RNA-ZNF532 regulates diabetes-induced retinal pericyte degeneration and vascular dysfunction[J]. J Clin Invest, 2020, 130(7): 3833-3847.
- [9] PHOENIX K N, YUE Z C, YUE L X, et al. PLCβ2 promotes VEGF-induced vascular permeability[J]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2022, 42(10): 1229-1241.
- [10] LEE S K, KIM M J, SON S H, et al. Xanthorrhizol suppresses vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis by modulating Akt/ENOS signaling and the NF-κB-dependent expression of cell adhesion molecules[J]. Am J Chin Med, 2021, 49(3): 737-751.
- [11] 张传政,郑兵,屈芳,等.血管内皮生长因子在脑出血中的发病机制及治疗进展[J].中国实用神经疾病杂志,2024,27(5):643-647.
- [12] HART P C, RAJAB I M, ALEBRAHEEM M, et al. C-reactive protein and cancer-diagnostic and therapeutic insights[J]. Front Immunol, 2020, 11: 595835.
- [13] 李莉,刘建华,王杨,等.肺炎支原体与流感病毒混合感染患儿 WBC、CRP 指标变化监测[J].中国实验诊断学,2024,28(5): 523-526.
- [14] 康会贤,张蕾,马夕锐,等.孕妇早期血清 miR-29a-3p 和 VEGFA 表达水平及其对子痫前期预测价值研究[J].现代检验医学杂志, 2023,38(2):32-36.

收稿日期:2024-09-23

(本文编辑:钟美春)