
黄永曼，涂金明.消化性溃疡出血患者内镜下治疗后再出血风险的列线图构建与验证（见正文第 536 页）



注：PUB 为消化性溃疡，PT 为凝血酶原时间，AIb 为清蛋白

图 1　列线图风险模型





图 2　列线图风险模型的校正曲线


毛伟.准分子激光治疗性角膜切削术联合角膜基质透镜贴敷术 1 例报告（见正文第 542 页）



注：A 为右眼，B 为左眼

图 3　术后 9 个月二眼表现

郭渔，魏黎，许烂漫.白介素-37 在慢性肝病病程中的作用进展（见正文第 550 页）



注：Pro-IL-37 为前体 IL-37，Caspase-1 为半胱氨酸蛋白酶-1，Proteases 为蛋白酶，TLR4 为 Toll 样受体 4，NF-κB 为核因子κB，mTOR 为哺乳动物雷帕霉素靶蛋白，MAPK 为丝裂原活化蛋白激酶，NLRP3 为 NOD 样受体热蛋白结构域蛋白 3，AMPK 为腺苷酸激活蛋白激酶，PTEN 为磷酸酯酶与张力蛋白同源物。胞内途径中，IL-37 与 Smad3 结合后易位进入细胞核，调节基因转录；胞外途径中，IL-37 与 IL-18Rα、IL-1R8 三者形成复合物，从而发挥抗炎、抗肝纤维化、抗肿瘤作用

图 4　IL-37 的胞内胞外作用机制图