

颜秋文，邵国丰.环状 RNA hsa_circ_0001204 在风湿性心脏瓣膜病中的诊断价值（见正文第 1130 页）



注：A 为各组血浆 has_circ_0001204 的表达，B 为 RVHD 组、非 RVHD 组瓣膜组织 has_circ_0001204 的表达，C 为男性患者血浆 has_circ_0001204 的表达，D 为女性患者血浆 has_circ_0001204 的表达。RVHD 为风湿性心脏瓣膜病，a$P < 0.05$


图 1　has_circ_0001204 在血浆及组织间的表达



注：A 为血浆中 has_circ_0001204 的表达诊断 RVHD 的 ROC 曲线，B 为瓣膜中 has_circ_0001204 的表达诊断 RVHD 的 ROC 曲线，RVHD 为风湿性心脏瓣膜病

图 2　has_circ_0001204 诊断 RVHD 的 ROC 曲线

韩雯清，应丽娜，李宇宁，等.自制复合型骨代谢标志物质控品性能验证及临床应用（见正文第 1162 页）



注：A 为−80 ℃下自制复合型骨代谢标志物质控品储存 12 个月相对变化率，B 为−20 ℃下自制复合型骨代谢标志物质控品储存 12 个月相对变化率，C 为 2 ～ 8 ℃下自制复合型骨代谢标志物质控品储存 1 个月相对变化率，D 为 37 ℃下自制复合型骨代谢标志物质控品储存 7 d 相对变化率。TPINP 为总 I 型胶原氨基端延长肽，OC 为骨钙素，β-CTx 为β-I 型胶原羧基端肽，25(OH)D 为 25 羟维生素 D，SHBG 为性激素结合球蛋白。H 指高浓度，L 指低浓度

图 3　稳定性结果评价